

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

NLP 27-6-73 542619

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative - 67084 STRASBOURG CEDEX

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 30 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67070 STRASBOURG-CEDEX

Supplément n° 4 au Bulletin n° 153 du mois de Juin 1973.

26 Juin 1973

VIGNE

MILDIOU

Le traitement conseillé dans notre note du 21 Juin n'a pu être effectué, sauf quelques rares exceptions, en raison de fortes pluies qui se sont abattues sur le vignoble les 21-22 et 23 Juin ainsi que localement le 24 Juin.

Nous traversons une période extrêmement dangereuse. Des attaques, localement graves, de Mildiou sont à attendre dans les parcelles insuffisamment protégées, où d'ailleurs le Rot gris (Mildiou sur grappe) est en voie d'installation.

TRAITER DE TOUTE URGENCE.

ARBRES FRUITIERS

- POMMIER - POIRIER -

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Le vol des papillons en cage d'élevage reste soutenu, malgré un léger fléchissement au cours de ces derniers jours par suite de l'abaissement des températures.

Le premier traitement a perdu une grande partie de son efficacité : accroissement des fruits, mais surtout par lessivage du produit par les pluies récentes.

Le renouvellement du traitement insecticide s'impose dans tous les vergers avant le 28 Juin.

- CERISIER -

ANTHRACNOSE DU CERISIER

Les conditions climatiques actuelles sont très favorables au développement de cette maladie.

On aura soin de faire un bon traitement fongicide sur tous les arbres où la récolte est maintenant terminée. Sur les variétés tardives, intervenir immédiatement après la récolte.

Sur les sujets en pépinière, traiter dès réception de la présente note.

Pour le choix des produits, se reporter à notre note du 5 Juin.

.../...

259

GRANDES CULTURES

- HOUBLON -

MILDIOU

Les houblons arrivent à un stade de grande sensibilité à la maladie. En cette période de début floraison et en raison de l'élongation des lianes laissant une surface végétative importante sans protection, un nouveau traitement devra être réalisé dans l'ensemble des houblonnières.

Traiter avec beaucoup de soin.

PUCERONS

Dans les houblonnières n'ayant pas fait l'objet d'un traitement au diméfox, suivre l'évolution des colonies de façon à ajouter, si nécessaire, un aphicide à la bouillie destinée à lutter contre le Mildiou.

- MAIS -

PYRALE DU MAIS

Les premiers papillons de Pyrale du maïs ont été capturés depuis quelques jours dans les élevages. Attendre de nouvelles instructions de la Station pour lutter contre ce ravageur.

CULTURES MARAICHÈRES

- TOUTES CULTURES -

NOCTUELLES ou VERS GRIS

Des dégâts de Vers gris nous sont signalés dans plusieurs zones maraîchères de la circonscription.

La lutte contre les Vers gris n'est vraiment efficace que par l'emploi d'appâts empoisonnés, que l'on place le soir entre les lignes de cultures, sur sol humide de préférence.

En dehors, des appâts que l'on trouve dans le commerce, il est facile de les préparer soi-même sur la base suivante :

Appât empoisonné composé de : (quantité pour 1 hectare)

- son : 100 kg
- eau : 15 à 60 l

- endosulfan: 200 g ou lindane : 400 g ou toxaphène : 600 g. M.A.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles :
C. GACHON et Ch. JANUS.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la
Circonscription Phytosanitaire
"ALSACE ET LORRAINE"
J. HARRANGER

Dernière note parue : Supplément n° 3 au Bulletin n° 153 publié le 21 Juin 1973.